



ВАЖНО

- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать или лечить нежелательные реакции
- Не прекращайте лечение пембролизумабом, пока не обсудите это со своим врачом.
- **Всегда носите эту Памятку с собой**, особенно во время путешествий, при посещении отделения неотложной помощи или когда вам необходимо обратиться к другому врачу.
- Носите эту Памятку с собой в течение, как минимум, 4 месяцев после последнего назначения пембролизумаба.
- Обязательно сообщайте любому медицинскому работнику, которого Вы посетите, что Вы проходите лечение пембролизумабом, и показывайте ему эту Памятку.



ВАЖНО

Если у вас возникли любые нежелательные реакции, в том числе не описанные в Листке-вкладыше для пациента, обратитесь к лечащему врачу. Также можно передать эту информацию любым удобным способом:

- **в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»** с использованием формы извещений о нежелательных реакций на сайте www.rceth.by, по электронной почте rcip@rceth.by или по адресу 220037 г. Минск, Товарищеский пер. 2а, тел/факс 242-00-29;
- **в АО «БИОКАД»** с использованием онлайн формы на сайте www.biocad.ru/farmakonadzor или по электронной почте safety@biocad.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Данный пациент проходит лечение препаратом Пемброриа (пембролизумаб), который может вызывать иммуноопосредованные нежелательные реакции, которые могут проявиться в любой момент как во время терапии, так и после ее завершения. Необходимо обследовать пациентов на наличие признаков и симптомов иммуноопосредованных нежелательных реакций. Ранняя диагностика и надлежащая терапия позволят минимизировать последствия иммуноопосредованных нежелательных реакций.

При подозрении на иммуноопосредованные нежелательные реакции проведите надлежащее

обследование для подтверждения их этиологии или исключения иных причин. В зависимости от степени тяжести нежелательной реакции следует отменить пембролизумаб и назначить кортикостероиды.

Специальные рекомендации по лечению иммуноопосредованных нежелательных реакций, приведены в Общей характеристике лекарственного препарата пембролизумаб. При лечении органоспецифичных иммуноопосредованных нежелательных реакций целесообразно проконсультироваться с врачом-онкологом или другим врачом узкого профиля, специализирующимся в соответствующей терапевтической области.

Для более подробной информации, обратитесь пожалуйста к Листку-вкладышу для пациента препарата Пемброриа.

Для доступа к актуальному Листку-вкладышу для пациента перейдите по ссылке <https://www.rceth.by/Refbank>.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

с целью минимизации риска иммуноопосредованных нежелательных реакций



BIOCAD

Препарат пембролизумаб может вызвать определенные серьезные нежелательные реакции, в некоторых случаях они могут создать угрозу для жизни и привести к смерти. Эти нежелательные реакции могут развиваться в любой момент во время лечения или даже после его завершения. Одновременно могут развиваться несколько нежелательных реакций.

В случае появления каких-либо признаков или симптомов, в том числе не указанных в настоящей памятке, незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу.

Врач может назначить Вам другие лекарственные препараты, чтобы предотвратить развитие более тяжелых осложнений и снизить выраженность имеющихся у Вас симптомов. Ваш лечащий врач может отложить назначение следующей дозы пембролизумаба или прекратить лечение.

Для более подробной информации, обратитесь пожалуйста к Листку-вкладышу для пациента препарата Пемброриа.

Для доступа к актуальному Листку-вкладышу для пациента перейдите по ссылке <https://www.rceth.by/Refbank>.



ЛЕГКИЕ

- Одышка
- Боль в груди
- Кашель



ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ

- Диарея или более частые опорожнения кишечника, чем обычно
- Черный, дегтеобразный, липкий стул, содержащий кровь или слизь
- Сильная боль или болезненность в животе
- Тошнота или рвота



ПЕЧЕНЬ

- Тошнота или рвота
- Снижение аппетита
- Боли в правой части живота
- Пожелтение кожи или белков глаз
- Темная моча
- Кровотечение или синяки появляются легче, чем обычно



ПОЧКИ

Изменение количества или цвета мочи



ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА

- Учащенное сердцебиение
- Потеря или увеличение веса
- Повышенная потливость
- Выпадение волос
- Чувство холода
- Запор
- Изменение голоса
- Мышечные боли
- Головокружение или обмороки
- Головная боль, которая не проходит, или необычная головная боль



ТИПА, ВКЛЮЧАЯ ДИАБЕТИЧЕСКИЙ КЕТОАЦИДОЗ

- Повышенное чувство голода или жажды
- Частые позывы к мочеиспусканию
- Потеря веса
- Чувство усталости или слабости
- Боль в животе
- Учащенное и глубокое дыхание
- Спутанность сознания
- Необычная сонливость
- Сладкий запах изо рта
- Сладкий или металлический привкус во рту
- Изменение запаха мочи или пота

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФИО врача

Телефон

ФИО пациента

Телефон

Контактное лицо
для экстренных случаев

Телефон